



# Mountain West - Gastroenterología

Instrucciones de Preparación para Colonoscopia con COLYTE

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Oscar A. Batista, M.D.      | <input type="checkbox"/> Brett W. Doxey, M.D.   | <input type="checkbox"/> Randall J. Ryser, M.D.        |
| <input type="checkbox"/> Mark E. Boschert, M.D.      | <input type="checkbox"/> Peter C. Fenton, M.D.  | <input type="checkbox"/> Michael J. Sossenheimer, M.D. |
| <input type="checkbox"/> Edward J. Frech, M.D.       | <input type="checkbox"/> Clarke A. Hilbig, M.D. | <input type="checkbox"/> I. Raymond Thomason, M.D.     |
| <input type="checkbox"/> Gordon E. Harmston, M.D.    | <input type="checkbox"/> Robert G. Jones, M.D.  |  |
| <input type="checkbox"/> Christopher C. Canale, M.D. | <input type="checkbox"/> D. Rayburn Moore, M.D. |  |

## 7 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:

- Deje de tomar **Aspirina, Ginkgo Biloba** o **Plavix**. Puede tomar Tylenol. Si tiene un trastorno cardíaco, tuvo un infarto reciente o una colocación de stent coronario, debería analizar esto con su cardiólogo o médico de atención primaria antes de dejar de tomar cualquier agente anticoagulante.
- Si está tomando anticoagulantes como **Coumadin**, debería analizar con su cardiólogo o médico de atención primaria cómo administrar sus anticoagulantes antes del procedimiento.
- Si ha tenido una válvula cardíaca mecánica, historial de trombosis venosa profunda en sus piernas, o una embolia pulmonar, es posible que necesite **Lovenox** o **Heparin** hasta el día del procedimiento y probablemente después del procedimiento.
- Si tiene **diabetes**, siga las instrucciones adjuntas y analice esto con su médico de atención primaria. Controle el nivel de su azúcar en sangre antes de venir al examen y traiga la lectura con usted. Si toma medicamentos orales para la diabetes, no los tome la mañana del procedimiento salvo indicación de su médico. Si toma insulina, traiga la insulina con usted. Si toma insulina en la mañana, tome sólo la ½ de su dosis habitual.

## 5 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:

Evite ingerir alimentos con alto contenido de fibras, suplementos con fibras y discontinúe cualquier suplemento con **hierro** 5 días antes de su examen.

## 3 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:

Deje de tomar todos los medicamentos antiinflamatorios como **Ibuprofen, Advil, Naproxen, Excedrin, Aleve** o similares. Puede tomar Tylenol para el dolor.

**Obtenga la receta de Colyte en su farmacia.**

## 2 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:

Puede tomar su cena habitual, pero deje de comer sólidos después de las **7:00 pm**. A partir de entonces puede continuar bebiendo únicamente líquidos claros. Esto significa líquidos a través de los cuales se puede ver como jugo de manzana, agua, Sprite, gelatina Jell-O, café (sin crema ni leche), té, caldo de gallina o de carne traslúcido, Gatorade de color claro, Powerade de color claro o Crystal Light. \*NO debe consumir productos con leche o con pulpa: no beba nada con colorante rojo, púrpura o naranja.

## 1 DÍA ANTES DE SU EXAMEN: ¡No debe comer ningún alimento sólido hasta después del procedimiento!

**Uno de los aspectos más importantes de una preparación exitosa es consumir abundante líquido el día antes del examen.**

En la mañana, agregue agua hasta llenar la jarra de Colyte, agite bien y refrigere. Si lo prefiere, sólo agregue agua fría al recipiente un par de horas antes de comenzar a beber la preparación. No agregue nada a la preparación de Colyte como refrescos con gas, etc.

**Restrinja su dieta a líquidos claros únicamente, no sólidos.** Los líquidos se pueden tomar sin restricciones.

Aproximadamente a las **5:00 pm**, comience a beber su preparación Colyte. Beba ½ galón de Colyte (total 2 litros) durante 2 horas.

Puede continuar bebiendo agua para mantenerse hidratado.

## EL DÍA DE SU EXAMEN: ¡No debe comer ningún alimento sólido hasta después del procedimiento!

- Si tiene diabetes, controle el nivel de azúcar en sangre antes de venir a su examen y traiga la lectura con usted. Si toma medicamentos orales para la diabetes, no los tome la mañana del procedimiento salvo indicación en contrario de su médico. Si toma insulina, traiga la insulina con usted. Si toma insulina en la mañana, tome sólo la ½ de su dosis habitual.
- Recuerde **TOMAR SUS MEDICAMENTOS HABITUALES** (no anticoagulantes, no antiinflamatorios no esteroideos, no aspirinas, no Plavix) la mañana del procedimiento.
- Al menos 4-5 horas antes del horario programado de su llegada al centro de endoscopia, beba el restante ½ galón de Colyte (2 litros) durante 2 horas. **Asegúrese de terminar la botella.** Puede experimentar dolor de cabeza,

escalofríos o náuseas debido a Colyte; no se alarme. Es posible que tenga que sentarse en el inodoro mientras toma su preparación Colyte. Cuando la termine por completo, puede continuar bebiendo agua hasta dos horas antes del horario programado de su llegada. Deje de beber 2 horas antes del horario programado de su llegada al centro.

- **Madres que amamantan** – Bombeo y tire la leche dos veces después del procedimiento antes de retomar el amamantamiento.

**Puede aplicar óxido de zinc, Vaselina, toallitas húmedas con Aloe o petrolato en la zona anal para prevenir irritación. También puede considerar las toallitas húmedas o apósitos Tucks.**

**Venga acompañado al centro de endoscopia para que lo lleven a su casa, ya que estará bajo el efecto de la sedación debido al examen. Usted no debe conducir por 12 horas.**

Su examen se cancelará o deberá realizarse sin sedación si no tiene a alguien que lo acompañe a su casa.

Usted estará en el Laboratorio de Endoscopia aproximadamente dos a tres horas. El médico hablará con usted después del examen y le dará recomendaciones para la dieta, medicamentos, cuidados posteriores, etc. Use ropa cómoda; traiga sus lentes, dispositivos auditivos, tarjeta(s) del seguro y formulario de información completo.

Esperaremos el pago de copagos, coseguros y deducibles en el momento de la atención médica.

Si su seguro requiere una recomendación, usted debería comunicarse con su médico de atención primaria para coordinar que recibamos la recomendación antes del procedimiento.

**Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web [www.mwgi.com](http://www.mwgi.com).**

**Usted puede recibir TRES cuentas por separado por este procedimiento: 1 - Médico, 2 - Instalaciones, 3 - Patología**

---

Colonoscopia       Sigmoidoscopia flexible       EGD/Colon       EGD/ Sigmoidoscopia flexible

#### **SU PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO EN EL SIGUIENTE LUGAR Y HORARIO:**

- Mountain West Endoscopy Center, 6360 South 3000 East, Ste 320, SLC, UT.**  
801-944-3166  
Si nosotros no lo llamamos el día antes del procedimiento, llame al 801-944-3166 para pre-registrarse.
- Intermountain Medical Center, 5121 South Cottonwood Drive, Murray, UT.**  
801-507-3262  
Regístrese en el Edificio para Pacientes Externos Eccles, Nivel 2. Servicio de estacionamiento valet gratuito disponible.  
Llame el día antes del procedimiento para pre-registrarse, 801-314-4395
- Davis Hospital & Medical Center, 1600 Antelope Drive, Layton, UT.**  
Use la entrada de Emergencias. Teléfono 801-807-7034.
- Lakeview Hospital, 630 E Medical Dr, Bountiful, UT.**  
801-299-4657  
Entrada sur, Registro de cirugías ambulatorias.
- Lakeview Endoscopy Center, 620 E Medical Dr, Suite 200, Bountiful, UT.**  
Llame el día antes del procedimiento para pre-registrarse, 296-2122.
- LDS Hospital, 8th Avenue & C Street, SLC, UT. ~Dr. Batista únicamente~**  
801-408-1057  
Entrada por el Ala Oeste del Hospital. Llame el día antes del procedimiento para pre-registrarse.  
Servicio de estacionamiento valet gratuito disponible.
- Riverton Hospital, 3742 West 12600 South, Riverton, UT 801-285-2775**  
Entrada principal (esquina de Nordeste) signo en en el quiosco, tome un paginador y la admisión vendrá le consiguen del área de espera.

**En caso de cualquier pregunta llame a nuestra oficina al \_\_\_\_\_**