



Mountain West - Gastroenterología

PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIA CON MIRALAX

2 DÍAS DE PREPARACIÓN

<input type="checkbox"/> Oscar A. Batista, M.D.	<input type="checkbox"/> Brett W. Doxey, M.D.	<input type="checkbox"/> Randall J. Ryser, M.D.
<input type="checkbox"/> Mark E. Boschert, M.D.	<input type="checkbox"/> Peter C. Fenton, M.D.	<input type="checkbox"/> Michael J. Sossenheimer, M.D.
<input type="checkbox"/> Edward J. Frech, M.D.	<input type="checkbox"/> Clarke A. Hilbig, M.D.	<input type="checkbox"/> I. Raymond Thomason, M.D.
<input type="checkbox"/> Gordon E. Harmston, M.D.	<input type="checkbox"/> Robert G. Jones, M.D.	
<input type="checkbox"/> Christopher C. Canale, M.D.	<input type="checkbox"/> D. Rayburn Moore, M.D.	

7 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:

- Deje de tomar **Aspirina, Ginkgo Biloba o Plavix**. Puede tomar Tylenol. Si tiene un trastorno cardíaco, tuvo un infarto reciente o una colocación de stent coronario, debería analizar esto con su cardiólogo o médico de atención primaria antes de dejar de tomar cualquier agente anticoagulante.
- Si está tomando anticoagulantes como **Coumadin**, debería analizar con su cardiólogo o médico de atención primaria cómo administrar sus anticoagulantes antes del procedimiento.
- Si ha tenido una válvula cardíaca mecánica, historial de trombosis venosa profunda en sus piernas, o una embolia pulmonar, es posible que necesite **Lovenox o Heparin** hasta el día del procedimiento y probablemente después del procedimiento.
- Si tiene **diabetes**, siga las instrucciones adjuntas y analice esto con su médico de atención primaria. Controle el nivel de su azúcar en sangre antes de venir al examen y traiga la lectura con usted. Si toma medicamentos orales para la diabetes, no los tome la mañana del procedimiento salvo indicación de su médico. Si toma insulina, traiga la insulina con usted. Si toma insulina en la mañana, tome sólo la ½ de su dosis habitual.

5 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:

Evite ingerir alimentos con alto contenido de fibras, suplementos con fibras y discontinúe cualquier suplemento con **hierro** 5 días antes de su examen.

3 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:

Deje de tomar todos los medicamentos antiinflamatorios como **Ibuprofen, Advil, Naproxen, Excedrin, Aleve o similares**.

Puede tomar Tylenol para el dolor.

En su farmacia o tienda compre:

1. Cuatro tabletas de **DULCOLAX LAXANTE**.
2. **POLVO MIRALAX**, botella de 238 gramos (botella para 14 días).
3. **64 oz. de Gatorade o Powerade**. Los diabéticos pueden usar Gatorade de bajas calorías o líquido similar.
4. Una botella de 10 oz. de **Citrato de Magnesio**.

2 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN: ¡No debe comer ningún alimento sólido hasta después del procedimiento!

Beba únicamente "Líquidos claros" para el DESAYUNO, ALMUERZO y CENA. Esto significa líquidos a través de los cuales se puede ver como jugo de manzana, agua, Sprite, gelatina Jell-O, café (sin crema ni leche), té, caldo de gallina o de carne traslúcido, Gatorade de color claro, Powerade de color claro o Crystal Light. ***NO debe consumir productos con leche o con pulpa: no beba nada con colorante rojo, púrpura o naranja.**

Beba la cantidad de líquidos que desee, manténgase hidratado.

A las **7:00 pm** beba la botella de 10 oz. de Citrato de Magnesio. Puede continuar bebiendo líquidos claros.

1 DÍA ANTES DE SU EXAMEN: ¡No debe comer ningún alimento sólido hasta después del procedimiento!

Uno de los aspectos más importantes de una preparación exitosa es consumir abundante líquido el día antes del examen.

Restrinja su dieta a líquidos claros únicamente, no sólidos. Los líquidos se pueden tomar sin restricciones.

Mezcle la botella entera de 238 gramos de Miralax con 2 cuartos de galón de Gatorade en una jarra grande. Revuelva y deje enfriar.

Alrededor de las **5:00 pm**, tome las cuatro tabletas Dulcolax. Aproximadamente después de una hora de tomar las tabletas Dulcolax, comience a beber la mitad de la solución Miralax fría. Tome cerca de cuatro vasos de 8 onzas (32 onzas en total) durante un período de 2 horas (un vaso cada 15-30 minutos). Puede continuar bebiendo agua para mantenerse hidratado.

EL DÍA DE SU EXAMEN: ¡No debe comer ningún alimento sólido hasta después del procedimiento!

- Si tiene diabetes, controle el nivel de azúcar en sangre antes de venir a su examen y traiga la lectura con usted. Si toma medicamentos orales para la diabetes, no los tome la mañana del procedimiento salvo indicación en contrario de su médico. Si toma insulina, traiga la insulina con usted. Si toma insulina en la mañana, tome sólo la ½ de su dosis habitual.
- Recuerde TOMAR SUS MEDICAMENTOS HABITUALES (no anticoagulantes, no antiinflamatorios no esteroideos, no aspirinas, no Plavix) la mañana del procedimiento.
- Al menos 4-5 horas antes del horario programado de su llegada al centro de endoscopia, beba la ½ restante de la solución Miralax durante 2 horas. **Asegúrese de terminar la solución.** Puede continuar bebiendo agua hasta dos horas antes del horario programado de su llegada. Deje de beber 2 horas antes del horario programado de su llegada al centro.
- **Madres que amamenten** – Bombee y tire la leche dos veces después del procedimiento antes de retomar el amamantamiento.

Puede aplicar óxido de zinc, Vaselina, toallitas húmedas con Aloe o petrolato en la zona anal para prevenir irritación. También puede considerar las toallitas húmedas o apósitos Tucks.

Venga acompañado al centro de endoscopia para que lo lleven a su casa, ya que estará bajo el efecto de la sedación debido al examen. Usted no debe conducir por 12 horas.

Su examen se cancelará o deberá realizarse sin sedación si no tiene a alguien que lo acompañe a su casa.

Usted estará en el Laboratorio de Endoscopia aproximadamente dos a tres horas. El médico hablará con usted después del examen y le dará recomendaciones para la dieta, medicamentos, cuidados posteriores, etc. Use ropa cómoda; traiga sus lentes, dispositivos auditivos, tarjeta(s) del seguro y formulario de información completo.

Esperaremos el pago de copagos, coseguros y deducibles en el momento de la atención médica.

Si su seguro requiere una recomendación, usted debería comunicarse con su médico de atención primaria para coordinar que recibamos la recomendación antes del procedimiento.

Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web www.mwgi.com.

Usted puede recibir TRES cuentas por separado por este procedimiento: 1-Médico, 2-Instalaciones, 3-Patología

___ Colonoscopia flexible

___ Sigmoidoscopia flexible

___ EGD/Colon

___ EGD/ Sigmoidoscopia flexible

SU PROCEDIMIENTO ESTÁ PROGRAMADO EN EL SIGUIENTE LUGAR Y HORARIO:

- Mountain West Endoscopy Center, 6360 South 3000 East, Ste 320, SLC, UT.**
801-944-3166
Si nosotros no lo llamamos el día antes del procedimiento, llame al 801-944-3166 para pre-registrarse.
- Intermountain Medical Center, 5121 South Cottonwood Drive, Murray, UT.**
801-507-3262
Regístrese en el Edificio para Pacientes Externos Eccles, Nivel 2. Servicio de estacionamiento valet gratuito disponible.
Llame el día antes del procedimiento para pre-registrarse, 801-314-4395
- Davis Hospital & Medical Center, 1600 Antelope Drive, Layton, UT.**
Use la entrada de Emergencias. Teléfono 801-807-7034.
- Lakeview Hospital, 630 E Medical Dr, Bountiful, UT.**
801-299-4657
Entrada sur, Registro de cirugías ambulatorias.
- Lakeview Endoscopy Center, 620 E Medical Dr, Suite 200, Bountiful, UT.**
Llame el día antes del procedimiento para pre-registrarse, 296-2122.
- LDS Hospital, 8th Avenue & C Street, SLC, UT. ~Dr. Batista únicamente~**
801-408-1057
Entrada por el Ala Oeste del Hospital. Llame el día antes del procedimiento para pre-registrarse.
Servicio de estacionamiento valet gratuito disponible.
- Riverton Hospital, 3742 West 12600 South, Riverton, UT 801-285-2775**
Entrada principal (esquina de Nordeste) signo en en el quiosco, tome un paginador y la admisión vendrá le consiguen del área de espera.

En caso de cualquier pregunta llame a nuestra oficina al _____